

AVERTISSEMENTS GRICOLES

EDITION GRANDES CULTURES



STATION
POITOU-CHARENTES

000161
S.R.P.V.

13, ROUTE DE LA FORET
86580 BIARD

Bulletin n° 297 (17/95) 06/07/1995

TOURNESOL : Phomopsis, des contaminations récentes

MAIS : Stade 12 F à apparition des panicules.

PUCERONS

Situation - Préconisation

Les vols restent d'importance modérée ; les populations en culture sont faibles et régulées par les auxiliaires.

PYRALE

Situation

Depuis la fin de la période pluvieuse, des captures plus nombreuses sont signalées.

Préconisation

Dans les secteurs concernés, les interventions doivent être terminées en début de semaine prochaine.

Pour les parcelles en net retard végétatif, un décalage de 2-3 jours est possible.

TOURNESOL : stade E1 à F1.

PHOMOPSIS

Situation

A Biard, le niveau de maturation des périthèces a progressé et atteint 50 %. A la suite de la récente période pluvieuse des projections significatives ont été observées à Biard (86) et Sainte Soulle (17) ; pour les sites de Thuré (86), Chalais et Ruffec (16), les projections ont été d'importance moyenne.

En raison de la grande hétérogénéité de la durée des périodes d'humectation du feuillage, l'importance des contaminations consécutives à ces projections est très variable. Si le retour d'une période orageuse se confirme, de nouvelles contaminations seront possibles mais leur gravité sera très limitée, le stade début floraison étant atteint.

Préconisation

- Pour les parcelles très tardives non protégées à ce jour, intervenir rapidement sur les variétés sensibles et très sensibles (en tous secteurs), ainsi que sur les variétés peu sensibles en zone à forte pression (Avertel page 48).

- Ne pas réintervenir sur les parcelles traitées après les 20-22 juin.

- Pour les parcelles traitées avant les 20-22 juin, le renouvellement de la protection n'est à envisager que pour des situations particulières telles que : variétés sensibles et très sensibles en zone à forte pression n'ayant pas atteint le stade début floraison.

- Pour le choix des produits, il convient de préciser que les morpholines ont une curativité de l'ordre de 14-15 jours alors que celle des triazoles est de 7 jours.

BnF
S&T

D340 J 40830

721